

**1.** Mendel bezelyelerle yaptığı çalışmalar sonucu kalitimın temel ilkelerini bulmuştur. Mendel'i başarıya götüren üç temel etken vardır:

- Tek ve zıt özellikle çalışmak (yeşil tohumlu bezelyeleri sarı tohumlu bezelyelerle çaprazlamak)
- Çaprazlamalar sonucu oluşan bezelyeleri fenotiplerine göre sayısal olarak kaydetmek
- Bezelye bitkileri ve bu bitkideki belirli özelliklerle çalışmak

Mendel sarı tohumlu bezelyeleri yeşil tohumlularla çaprazladığında oluşan tüm bezelyelerin sarı tohumlu, sarı tohumluları kendi aralarında çaprazladığında oluşan bezelyelerin  $\frac{3}{4}$  ünün sarı,  $\frac{1}{4}$  ünün yeşil tohumlu olduğunu saptamıştır. Mendel çaprazlamalar sonucu etkisini ancak homozigot halde iken gösteren gene resesif (çekinik) gen demiştir.

**Buna göre,**

- I. Mendel bezelye tohumları ile çalışırken tek bir türde belirli bir özellikle ilgili çalışmaları sürekli tekrarlayarak başarıya ulaşmıştır.
- II. Mendel'in yaptığı nitel gözlemler nicel gözlemlerden daha etkili ve güvenli sonuçlar vermiştir.
- III. Mendel yeşil tohumluları kendi aralarında çaprazlayarak sadece resesif gen bulunduran tohumlar elde edebilir.

**İfadelerinden hangileri doğrudur?**

- A) Yalnız II      B) Yalnız III      C) I ve II  
D) I ve III      E) I, II ve III

**2. Mendel'in yaptığı çalışmalar ile,**

- I. Melez bir bireyde bulunan genler bu bireyde gametler oluşurken birbirlerinden bağımsız olarak ayrılır.
- II. Homozigot iki farklı genotipteki bireyin çaprazlanması sonucu oluşan  $F_1$  döllerinin tümü bu özellik bakımından homozigottur.
- III. Canlılarda gametler oluşurken bağımsız dağılım kuralı görülebilir.

**Sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?**

- A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III  
D) I ve III      E) I, II ve III

**3. Bağımsız dağılım kuralına göre  $KkLLMmnn$  genotipine sahip bir canının  $KLMn$  gametini oluşturma olasılığı kaçtır?**

- A)  $\frac{1}{2}$       B)  $\frac{1}{4}$       C)  $\frac{1}{6}$       D)  $\frac{1}{8}$       E)  $\frac{1}{12}$

**4. Dört karakter bakımından  $AaBBddEe$  genotipinde bir bitki, bağımsız dağılım kuralına göre aşağıdaki gametlerden hangisini oluşturamaz?**

Hangişini seçersiniz:

- A) ABdE      B) ABde      C) aBdE  
 D) ABDe      E) aBde

**5.** Mendel'in, bezelyelerde tohum rengi ve tohum şekli bakımından yaptığı çaprazlamaya dihibrit çaprazlama denir.

**Homozigot sarı - buruşuk tohumlu bezelye ile homozigot yeşil - düzgün tohumlu bezelye çaprazlandığında,**

- Oluşan bireylerin hepsi yeşil ve buruşuktur.
- Oluşan bireyler bu karakterler bakımından homozigot genotiplidir.
- Oluşan  $F_1$  döllerinde tek çeşit fenotip oluşur.

**açıklamalarından hangileri doğrudur?**

(Sarı tohum rengi geni, yeşil tohum rengi genine baskındır. Düzgün tohum şekli geni, buruşuk tohum şekli genine baskındır.)

- A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III  
 D) II ve III      E) I, II ve III

**7.** Bağımsız genlere sahip  $KKLImmNn$  genotipindeki bir canının oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı en fazla kaçtır?


- A) 1      B) 2      C) 4      D) 6      E) 8

**8.** Her iki karakter bakımından heterozigot olan bir bireyin kendileştirilmesi ile meydana gelen oğul döllerde oluşabilecek genotip çeşidi sayısı en fazla kaçtır?

(Genler bağımsızdır.)

- A) 2      B) 4      C) 6      D) 9      E) 12

**9.**



Yukarıdaki soy ağacında numaralarla belirtilen canlılardan hangilerinin normal koşullarda genetik açıdan akrabalık ilişkisi diğerlerine göre en azdır?

- A) 1 ve 2      B) 1 ve 8      C) 3 ve 4

D) 5 ve 6

E) 7 ve 8

- 10.** İnsanda göz rengi bakımından heterozigot kahverengi gözlü iki bireyin çaprazlanması sonucu,

1. mavi gözlü bireylerin oluşma olasılığı
2. heterozigot kahverengi gözlü bireylerin oluşma olasılığı
3. kahverengi gözlü bireylerin oluşma olasılığı

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

(Kahverengi göz geni mavi göz genine baskındır.)

	1	2	3
A)	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$
B)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$
C)	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
D)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
E)	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{4}$

- 11.** Beyaz kılı dişi fare ile homozigot siyah kılı erkek fareden oluşan zigot annenin döl yatağından alınarak başka bir homozigot siyah kılı dişi farenin döl yatağına yerleştiriliyor.

Oluşan yavru farenin genotipi ve fenotipi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

(Siyah kıl rengi, beyaz kıl rengine baskındır.)

	Genotip	Fenotip
A)	Homozigot	Siyah
B)	Heterozigot	Beyaz
C)	Heterozigot	Siyah
D)	Heterozigot	Gri
E)	Homozigot	Gri

- 12.** Bir karakter bakımından genotipleri aşağıda verilen bireylерden hangi ikisinin çaprazlanması sonucu oluşan oğul döllerin tamamı kesinlikle heterozigot olur?

- |            |            |            |
|------------|------------|------------|
| A) AA x AA | B) Aa x Aa | C) aa x aa |
| D) AA x aa | E) Aa x aa |            |

- 13.** İki karakter bakımından heterozigot  $F_1$  bireyinin kendileştirilmesi sonucunda oluşturulan Punnett karesi aşağıda verilmiştir.

$\frac{\text{♀}}{\text{♂}}$	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	AAAb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

$F_1$  ve  $F_2$  dölleri ile ilgili olarak,

- I. Çaprazlama sonucu oluşan  $F_2$  döllerinde fenotip ayrışım oranı 9:3:3:1 dir.
- II.  $F_2$  döllerinin dördünün genotipi  $F_1$  dölleri ile aynıdır.
- III. Çaprazlama ile 16 farklı genotip oluşur.
- IV.  $F_2$  döllerinde her iki karakter bakımından homozigot resesif birey oluşma olasılığı 1/16 dir.

bilgilerinden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız III      B) I ve III      C) II ve IV  
 D) I, II ve III      E) II, III ve IV

13. İki karakter bakımından heterozigot  $F_1$  bireyinin kendileştirilmesi sonucunda oluşturulan Punnett karesi aşağıda verilmiştir.

$\frac{\text{♀}}{\text{♂}}$	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	AAAb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

$F_1$  ve  $F_2$  dölleri ile ilgili olarak,

- I. Çaprazlama sonucu oluşan  $F_2$  döllerinde fenotip ayrışım oranı 9:3:3:1 dir.
- II.  $F_2$  döllerinin dördünün genotipi  $F_1$  dölleri ile aynıdır.
- III. Çaprazlama ile 16 farklı genotip oluşur.
- IV.  $F_2$  döllerinde her iki karakter bakımından homozigot resesif birey oluşma olasılığı 1/16 dir.

bilgilerinden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız III      B) I ve III      C) II ve IV  
 D) I, II ve III      E) II, III ve IV